

| Typ | Gromada | Obowiązująca nazwa wg. World Register of Marine Species | Wcześniejszta nazwa gatunkowa | 1939, 1947 | 1992- 1996 | 1997 | 2011 |
|----------------------------|--------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|------|------|
| Porifera | Demospongiae | <i>Ephydiata syriaca</i> | <i>Ephydiata fluviatilis</i> | | | + | |
| Cnidaria | Hydrozoa | <i>Cordylophora caspia</i> | | | | | + |
| | | <i>Gonathyraca loveni</i> | <i>Laomedea loveni</i> | | | + | |
| Platyhelminthales | Turbellaria | | | + | | | + |
| Nemertea | | | | + | | | |
| Annelida | Polychaeta | <i>Bylgides sarsi</i> | <i>Harmothoe sarsi</i> | | | + | |
| | | <i>Hediste diversicolor</i> | | + | + | + | + |
| | | <i>Marenzelleria viridis</i> | | | | + | |
| | | <i>Pygospio elegans</i> | | + | + | + | + |
| | | <i>Fabricia sabella</i> | | | | + | |
| | | <i>Manayunkia aestuarina</i> | | | | + | |
| | | <i>Streblospio shrubsolii</i> | | | | + | |
| | Oligochaeta | | | | + | + | + |
| Arthropoda | Crustacea | <i>Amphibalanus improvisus</i> | <i>Balanus improvisus</i> | + | + | + | + |
| | | Ostracoda | | | | + | + |
| | | <i>Heterotanais oerstedii</i> | | | | + | + |
| | | <i>Cyathura carinata</i> | | | + | + | + |
| | | <i>Melita palmata</i> | | | | + | |
| | | <i>Gammarus oceanicus</i> | | | + | + | + |
| | | <i>Gammarus salinus</i> | | | + | + | + |
| | | <i>Gammarus zaddachi</i> | | | | + | |
| | | <i>Gammarus tigrinus</i> | | | | + | |
| | | <i>Gammarus</i> sp. | | + | + | + | |
| | | <i>Bathyporeia pilosa</i> | | | + | + | |
| | | <i>Corophium volutator</i> | | | + | + | + |
| | | <i>Apocorophium lacustre</i> | | | | | + |
| | | <i>Corophium multisetosum</i> | | | | | + |
| | | <i>Crassicorophium crassicornue</i> | | | | | + |
| | | <i>Leptocheirus pilosus</i> | | | | | + |
| | | <i>Diastylis rathkei</i> | | | | | + |
| | | <i>Idotea chelipes</i> | | | + | + | + |
| | | <i>Idotea balthica</i> | | | | + | |
| | | <i>Jaera albifrons</i> | | + | + | + | |
| | | <i>Jaera</i> sp. | | | | | + |
| | | <i>Neomysis integer</i> | | | + | + | |
| | | Mysidae | | | | | + |
| | | <i>Crangon crangon</i> | | | + | + | |
| | | <i>Asellus aquaticus</i> | | | | | + |
| | Acaridae | | | | | | + |
| Insecta | | Insecta larvae | | + | + | | + |
| | | <i>Cricotopus silvestris</i> (larvae) | | | | + | |
| | | <i>Cricotopus latidentatus</i> (larvae) | | | | + | |
| Mollusca | Gastropoda | <i>Theodoxus fluviatilis</i> | <i>Hydrobia ulvae</i> | + | + | + | |
| | | <i>Peringia ulvae</i> | | + | + | + | |
| | | <i>Ventrosia ventrosia</i> | | | + | + | |
| | | <i>Hydrobia</i> sp. | | | | | + |
| | | <i>Potamopyrgus antipodarum</i> | | | | | + |
| | | <i>Tenellia adspersa</i> | | | | | + |
| | | <i>Mytilus trossulus</i> | <i>Potamopyrgus jankinsi</i> | + | + | + | + |
| | | <i>Macoma balthica</i> | | + | + | + | + |
| | | <i>Mya arenaria</i> | | | + | + | + |
| | | <i>Cerastoderma glaucum</i> | | + | + | + | + |
| | | <i>Dreissena polymorpha</i> | | | | | + |
| Bryozoa | | <i>Einhronia crustulenta</i> | <i>Electra crustulenta</i> | + | + | + | |
| | | | | | | | + |
| Sumaryczna liczba taksonów | | | | 14 | 23 | 36 | 38 |

* dane sprzed 2011 roku pochodzą z opracowania Osowieckiego i Żmudzińskiego (2000)